

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15 - 7 - 83205076

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 90 F

M. le Régisseur de recettes de la
D.D.A. du Loiret

93, rue de Curambourg - B.P. 210
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

BULLETIN TECHNIQUE N° 16

12 JUILLET 1983

MAIS-GRAIN

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU MAIS

Les premières pontes ont été déposées en culture. En raison du réchauffement constaté ces derniers jours, des sorties massives de papillons vont très probablement se produire et des pontes importantes devraient être déposées en fin de semaine.

Dans les zones précoces : Champagne Berrichonne, les Boischauts, Indre-et-Loire, sauf Gâtine Tourangelle, dans le Loir-et-Cher, la zone délimitée par Blois, La Chapelle Vendomoise, Marchenoir, Beaugency, St Laurent des Eaux, Nouan, le Loiret, la période optimale d'intervention se situe du 15 au 20 Juillet.

Pour les autres zones, plus tardives, il convient de retarder l'intervention d'une huitaine de jours : soit du 23 au 28 Juillet.

RECTIFICATIF AU BULLETIN N° 15

Il faut noter que le Sud du département d'Indre-et-Loire se trouve en zone infestée.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Depuis le 1er Juillet 1983, la Cypermethrine a reçu une autorisation de vente.

<u>M.A.</u>		<u>P.C.</u>	<u>FIRMES</u>	<u>TENEUR</u>	<u>DOSE/HA</u>
CYPERMETHRINE					
liquide	75 g	Cymbush	SOPRA	100 g/l	0,75
(pulvérisation)		Kafil super	LA QUINOLEINE		

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques d'augmentation de populations de pucerons qui pourraient résulter du traitement avec les pyréthri-
noïdes liquides en vue de la lutte contre la pyrale du maïs.

Le Décis liquide a reçu une autorisation provisoire de vente à la dose de 0,5 litre par hectare.

Nous tenons à préciser que dans tous les essais effectués par le Service de la Protection des Végétaux cette spécialité a été testée en traitement précoce (1 à 1,20 m du maïs) à la dose de 1 litre par hectare.

En attendant les résultats des essais complémentaires entrepris en 1983 et implantés dans la plupart des zones concernées par la Pyrale du maïs nous déconseillons l'utilisation de doses de Décis liquide inférieures à 0,8 litre/hectare qui risquent d'avoir une persistance insuffisante lorsque l'application se situe au stade 1 à 1,20 m du maïs.

PUCERONS

On constate une stagnation des populations. Pour l'essentiel, se reporter au Bulletin n° 15 du 4 Juillet.

MAIS DOUX

PYRALE

Dans le secteur de Villersfaux une intervention est maintenant justifiée. Dans les autres situations, attendre un prochain avis.

FLAGEOLETS

PYRALE

Les premières pontes ont été observées notamment dans la région de TALCY. Intervenir dans ce secteur avec une spécialité à base d'endosulfan : dose 41/ha.

Effectuer le traitement de préférence le soir. Les autres spécialités ne sont pas autorisées pendant la floraison.

Dans les autres situations, attendre de nouvelles informations de notre Station.

VESCES - LENTILLES

TORDEUSE DU POIS

Le vol continue ; une intervention peut encore se justifier en zone tardive (semis de fin Avril-début Mai) et pour les cultures présentant des jeunes gousses.

BETTERAVES

PUCERONS ET JAUNISSE

Quelques cas de jaunisse sont observés. Les cultures deviennent de moins en moins sensibles à la jaunisse.

Maintenir la protection contre les pucerons pour les cultures les moins développées.

Utiliser un produit qui respecte la faune auxiliaire (ex. PIRIMOR à 500 g/ha).

RHIZOMANIE ET NÉMATODES

Actuellement, l'infestation des betteraves par le virus de la Rhizomanie et les nématodes se manifestent sous forme de sensibilité accrue des betteraves au manque d'eau. Pour en avoir confirmation, nous vous conseillons de FAIRE PARVENIR au Service de la Protection des Végétaux de FLEURY LES AUBRAIS, DES ECHANTILLONS de betteraves présentant obligatoirement une quantité suffisante de racines.

NOCTUELLES

De faibles attaques sont constatées ; n'intervenir que si vous constatez des betteraves en dentelles.

OIDIUM

Aucun symptôme n'a été observé.